



PELOUSES DU PARC (Identifiant national : 240008632)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000243)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : NATURE CENTRE (BOYELDIEU J.), CBNBP (VUITTON G.), .- 240008632, PELOUSES DU PARC. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240008632.pdf>

Région en charge de la zone : Centre

Rédacteur(s) :NATURE CENTRE (BOYELDIEU J.), CBNBP (VUITTON G.)

Centroides calculé : 545621°-2398679°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 28/03/2008

Date actuelle d'avis CSRPN : 18/09/2017

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 31/10/2017

| | |
|---|---|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 8 |
| 9. SOURCES | 8 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [240003957](#) - VALLEES DE LA VOISE ET DE L'AUNAY (Id reg. : 2005)

1.1 Localisation administrative

- Département : Eure-et-Loir
- Commune : Maintenon (INSEE : 28227)

1.2 Superficie

3,05 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 110

Maximale (mètre): 140

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [240003957](#) - VALLEES DE LA VOISE ET DE L'AUNAY (Type 2) (Id reg. : 2005)

1.5 Commentaire général

Il s'agit de pelouses sèches calciphiles (à rattacher aux groupements du Mesobromion erecti) développées sur un versant pentu exposé au sud de la vallée de l'Eure, sur la commune de Maintenon. Ce milieu semble issu d'un pâturage ancien, aujourd'hui abandonné. L'intérêt de ce site a déjà été souligné lors de la première génération des ZNIEFF. Malgré le nombre d'espèces déterminantes de ZNIEFF assez restreint, ce site présente un intérêt à la fois pour son bon état de conservation global, et pour le rôle écologique qu'il joue, notamment pour la faune associée aux milieux ouverts et secs. On peut souligner la présence de la Bugrane naine (*Ononis pusilla*) citée historiquement sur le coteau, et de la Coronille naine (*Coronilla minima*) autre espèce remarquable pour le département. Ce site totalise une dizaine d'espèces déterminantes de ZNIEFF pour le région.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

Ce coteau est très pentu, dépassant sans doute les 45* localement.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Habitats - Ecologique - Faunistique - Floristique - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le contour est calé sur la limite de la zone en pelouse. Le périmètre a été largement resserré par rapport à la première génération pour exclure les zones boisées dont l'intérêt semble plus limité.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Fermeture du milieu | Intérieur | Oui | Réel |

Commentaire sur les facteurs

La fermeture du milieu par les fourrés semble assez lente. Une forte pression d'abrutissement a été notée, notamment grâce à l'action des chevreuils fréquentant le site. Cependant le Brachypode penné ferme les végétations dans la partie la plus à l'est.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|--------|-------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | | | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| <i>E1.262 Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus</i> | <i>34.322 Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus</i> | | Informateur : NATURE CENTRE (BOYELDIEU J.), CBNBP (VUITTON G.) | 20 | 1985 - 2017 |
| <i>F3.11211 Fourrés à Prunellier et Troène médio-européens</i> | <i>31.81211 Fruticées médio-européennes à Prunelliers et Troènes</i> | | Informateur : CBNBP (ROBOUAM N.) | 20 | 2017 - 2017 |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| <i>G1.A12 Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes</i> | <i>41.22 Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes</i> | | Informateur : NATURE CENTRE (BOYELDIEU J.), CBNBP (VUITTON G.) | 10 | 1985 - 2017 |
| <i>E1.263 Pelouses médio- européennes semi- sèches à <i>Brachypodium</i></i> | <i>34.323 Pelouses semi- arides médio- européennes dominées par <i>Brachypodium</i></i> | | Informateur : CBNBP (ROBOUAM N.) | 50 | 2017 - 2017 |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| <i>G1.C1 Plantations de <i>Populus</i></i> | <i>83.321 Plantations de <i>Peupliers</i></i> | | Informateur : CBNBP (ROBOUAM N.) | | 2017 - 2017 |
| | <i>82.11 Grandes cultures</i> | | Informateur : NATURE CENTRE (BOYELDIEU J.), CBNBP (VUITTON G.) | | 1985 - 1985 |
| | <i>86.2 Villages</i> | | Informateur : CBNBP (ROBOUAM N.) | | 2017 - 2017 |
| | <i>41.2 Chênaies-charmaies</i> | | Informateur : NATURE CENTRE (BOYELDIEU J.), CBNBP (VUITTON G.) | | 1985 - 1985 |

6.4 Commentaire sur les habitats

La présence d'anciennes marnières est favorable, à travers la microtopographie créée, aux groupements du *Teucrio-Bromenion* et plus précisément à l'association de l'*Avenulo-Festucetum*. ces groupements sont assez riches sur le plan floristique.

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 92527 | <i>Coronilla minima</i> L., 1756 | <i>Coronille naine, Coronille mineure</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (ROBOUAM N.) | Fort | 1 | 1 | 2017 - 2017 |
| | 110221 | <i>Ononis pusilla</i> L., 1759 | <i>Bugrane naine, Ononis de Colonna, Ononis grêle, Bugrane de Colonna</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (ROBOUAM N.) | Fort | 2 | 2 | 2017 - 2017 |
| | 110392 | <i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802 | <i>Ophrys bourdon, Ophrys frelon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ELN (CHERAMY E.) | | | | 2010 - 2010 |
| | 110410 | <i>Ophrys insectifera</i> L., 1753 | <i>Ophrys mouche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ELN (CHERAMY E.) | | | | 2010 - 2010 |
| | 110920 | <i>Orchis militaris</i> L., 1753 | <i>Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ELN (CHERAMY E.) | | | | 2010 - 2010 |
| | 111556 | <i>Orobanche gracilis</i> Sm., 1798 | <i>Orobanche grêle, Orobanche à odeur de Girofle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.), BOUDIER P. | | | | 2008 - 2010 |
| | 117986 | <i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798 | <i>Rosier des haies, Églantier agreste</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.) | Moyen | | | 2005 - 2017 |
| | 118474 | <i>Rosa rubiginosa</i> L., 1771 | <i>Rosier rubigineux, Rosier à odeur de pomme</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.), BOUDIER P. | | | | 2008 - 2008 |
| | 125981 | <i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753 | <i>Germandrée petit-chêne, Chênette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.) | Faible | | | 2005 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 126008 | <i>Teucrium montanum</i> L., 1753 | <i>Germandrée des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (DUPRE R.), BOUDIER P. | Moyen | 100 | 1000 | 2008 - 2017 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 110345 | <i>Ophrys aranifera</i> Huds., 1778 | <i>Ophrys araignée, Oiseau-coquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ELN (CHERAMY E.) | | | | 2010 - 2010 |

7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|--|----------------------|-------|
| Informateur | CBNBP (DUPRE R.), BOUDIER P. | | |
| | CBNBP (ROBOUAM N.) | | |
| | CBNBP (VUITTON G.) | | |
| | ELN (CHERAMY E.) | | |
| | NATURE CENTRE (BOYELDIEU J.), CBNBP (VUITTON G.) | | |